

Boletín fitosanitario contra la
Chinche café del sorgo

Productor de sorgo

Es importante revisar tu parcela al menos dos veces por semana para detectar a tiempo el arribo de la chinche café y poder implementar acciones de manejo oportunamente.




El daño es ocasionado al alimentarse directamente de los granos en la panoja.

Mantén libres las regaderas y bordos de zacates debido que son hospedantes de chinche café.



Adulto
Periodo pre y reproductivo
11 a 17 días



**Ciclo biológico
de la chinche café**
58 a 69 días



Huevecillos
5 a 8 días



Nínfas
5 estadias ninfales, 37 días

Si requieres asistencia técnica comunicarte al
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE GUANAJUATO
al teléfono

8 0 0 4 1 0 3 0 0 0

donde serás atendido por un personal técnico.



Comité Estatal de Sanidad Vegetal
de Guanajuato.

Av. Siglo XXI, No. 1156 Predio Los Sauces,
Irapuato, Gto. C.P. 36547
Tel (462) 626 9686.
Lada sin costo: 800 410 3000
cesaveg@cesaveg.org.mx
www.cesaveg.org.mx

Boletín fitosanitario contra la Chinche café del sorgo



— Revisión orilla de la parcela
— Revisión dentro de la parcela

A partir de la floración es importante revisar la parcela y muestrear 50 panojas, colocando una bolsa de plástico y sacudiendo para capturar el insecto.

El nivel máximo de la plaga para realizar medidas de control es de 4 chinches en promedio en un 20% de panojas muestreadas

Cuadro básico de recomendación de insecticidas para el control químico de chinche café del sorgo.

Ingrediente activo	Modo de Acción	Grupo químico	Formulación	Dosis/ha	PRH1	ISD2
Lamdacialotrina	Moduladores del canal de sodio (3)	Piretroides	6.5 CE	200-300ml	6	5
Malation	Inibidores de la acetilcolinesterasa (1b)	Organofosforado	83.6 CE	500 ml	24	7
Malation	Inibidores de la acetilcolinesterasa (1b)	Organofosforado	4 DP	20-25 kg	12	7

1 PRH Periodo de reentrada en horas.

2 ISD Intervalo de seguridad en días a cosecha. Para prevenir la resistencia realizar rotación de insecticidas de diferente modo de acción.



Recuerda que las aplicaciones injustificadas de insecticidas pueden dañar a la fauna benéfica y a otros insectos de importancia como las abejas y polinizadores.

Únicamente realiza el control químico en caso de ser necesario es decir, cuando se alcance el nivel máximo de la plaga ya mencionado.

Si requieres asistencia técnica comunicarte al
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE GUANAJUATO
 al teléfono
8 0 0 4 1 0 3 0 0 0
 donde serás atendido por un personal técnico.



Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato.

Av. Siglo XXI, No. 1156 Predio Los Sauces, Irapuato, Gto. C.P. 36547
 Tel (462) 626 9686.
 Lada sin costo: 800 410 3000
cesaveg@cesaveg.org.mx
www.cesaveg.org.mx