Boletín fitosanitario contra la

Chinche café del sorgo

Productor de sorgo



"Como identificar a la chinche café de otras chinches"



El daño es ocasionado al alimentarse directamente de los granos en la panoja.

Mantén libres las regaderas y bordos de zacates debido que son hospedantes de chinche café.



Adulto
Periodo pre y reproductivo
11 a 17 días

Nínfas 5 estadias ninfales, 37 días Ciclo biológico de la chinche café 58 a 69 días



Si requieres asistencia técnica y capacitación comunícate al CESAVEG al 800 410 3000









Boletín fitosanitario contra la

Chinche café del sorgo



A partir de la floración es importante revisar la parcela y muestrear 50 panojas, colocando una bolsa de plástico y sacudiendo para capturar el insecto.

El nivel máximo de la plaga para realizar medidas de control es de 4 chinches en promedio en un 20% de panojas muestreadas

Cuadro básico de recomendación de insecticidas para el control químico de chinche café del sorgo.

Nombre genérico	Grupo químico	Formulación	Dosis/ha	PRH1	ISD2	Categoría toxicológica
Cipermetrina	Piretroide	0.5 DP	20-25 kg	24	14 días	III- Poco peligroso
Lamdacialotrina	Piretroide	50 CS	0.3 L	12	15 días	III- Poco peligroso

1 PRH Periodo de reentrada en horas.

2 ISD Intervalo de seguridad en días a cosecha.



Recuerda que las aplicaciones injustificadas de insecticidas pueden dañar a la fauna benéfica y a otros insectos de importancia como las abejas y polinizadores.

Únicamente realiza el control químico en caso de ser necesario es decir, cuando se alcance el nivel máximo de la plaga ya mencionado.

Si requieres asistencia técnica y capacitación comunícate al CESAVEG al 800 410 3000





